PLANTARUM RARIORUM SICILIAE MINUS COGNITARUM PUGILLUS...

Vincenzo Tineo

BROMUS TENUIS

I.

Humilis. Culmis gracilibus, basi geniculatis adscendentibus. Foliis lineari-acuminatis, laevibus, vaginis striatis, rubescentibus. Panic. simpl., spic. 6-8 pedicellatis, alternis, disticis, oblongis. Flor. linearibus, remotiusculis, pedic. supra incrassatis, post anthesin rubesc., angulatis, scabris. Gl. Cal. inaequalibus carina, et margine scabris, nervosis. Gl. corol., esteriori sub apice aristata, aristis longitudine glumae, inferioribus rectis, super. flexuosis; interiori apice bifida mutica.

Annuus.

Hab. prope Agrigentum.

II.

Humilis. Radicibus fibrosis, culmis basi geniculatis, dein erectis, foliis lineari-lanceolatis, pilosis, vaginis striatis. Panic. simpl., spic. sessilibus. 4-5 disticis alternis, lanceolatis. 8-10 flor. Gl. Cal. inaequalibus carinatis, nervosis, mucronatis, interiori trinervi, ester. quinquenervi. Gl. corol., esteriori aristata, arista scabra erecta terminali, interiori aculeato-ciliata mutica.

Annuus.

Hab. l. c.

VIOLA PARVULA

III.

Parva, caulesc. Foliis inferioribus subrotundis, superioribus obovatis, pilosis, sub crenatis, petiolis ciliatis, stipulis oblongis, dente notatis, ciliatis; pedunculis axillaribus unifloris, floribus cernuis luteis.
Annua.

Hab. in Nebrodibus. Sutta la Curma grandi.

DAUCUS SICULUS

IV.

Caule erecto, ramoso, striato, hispido, foliis inferioribus bipinnatis, super. pinnatis, petiolis, et nervaturis foliorum magis hirsutis, vaginis nervosis, amplexicaulibus, ciliatis, foliolis ovatis basi inaequalibus, inciso - dentatis, dentibus obtusis, mucronatis. Involuc. univers., umbella majoribus 5 phyllis, foliolis pinnatifidis, aut trifidis, laciniis planis, lanceolatis, acuminatis. Umbellul. ester. flavis, interior. rubescentibus.

Biennis.

Hab. propre Drepanum.

V.

Spinosum. Foliis petiolatis, quinatis, et ternatis, foliolis oblongo cuneatis, irregularibus, intermediis, trifidis, vel quinquefidis, vel dentatis, esterioribus integerrimis, ramis super. patentibus, inferior. divaricatis, flexuosis. Fructibus e viridi-rubris.

Arbor.

Rh. pentaphyllum foliis ternatis, foliolis lineari-lanceolatis, integerrimis, petiolis dilatatis. Desf. Atl. 1 p. 267 t. 77.

Rhamnus pentaphyllus L. Bocc. t. 21.

Hab. prope Xaccam.

Nom. Sic. Zaccatu.

VI.

Spinosum. Foliis petiolatis ternatis, foliolis cuneatis, ultra dimidium dentatis, supra lucidis, nervaturis prominentibus. Ramis divaricatis flexuosis, rubescent., flor. racemosis terminalibus.

Arbor.

Fruct. antecedenti minor.

Rhamnus tripartita spinosa, foliis petiolatis, tripartitis, argute - serratis. Bernard. Ucr. Pl. ad Linn. op. add.

Ramnus apii folio triphylla, spinis colore, et substantia fructus Ziziphinus Cup. Pamph.

Hab. in montuosis S. Flaviae, et S. Viti.

Nom. Sic. Lignu di Santu Vitu.

VII.

Scapis nudis, 4 pedal., subcilindricis, foliis radicalibus basi vaginantibus, lineari-lanceolatis, carinatis, longissimis: Umbella inaequali, petalis tribus esterioribus majoribus, interioribus basi angustatis: Staminibus simpl., florib. post anthesin nutantibus.

Allium Sicul. scapo vaginato (male) vagina angulata, petalis esterioribus majoribus, interioribus basi angustatis, foliis planis (pessime) staminibus simplicibus. Bernard. Ucr. l. c.

Moly fl. subviridi Bocc. Pl. Rar.

Allium fl. e luteo virescentibus Tour. Bonan. Tav. 25.

Hab. in Nebrodibus. Alla muntagna di lu ferru. *Prope Politium* a lu Vadduni di Miranda.

ARENARIA BARTOLOTTI

VIII.

Caule decumbente, paniculato dichotomo, ancipiti. Panicula pubescente, foliis oppositis, lanceolatis, subglabris, petalis ovatis, albis, calyce sub aequalibus, foliolis calycinis ovato-lanceolatis, margine membranaceis.

Hab. in maritimis prope Gelam.

IX.

Sub herbacea. Foliis oblongis, spatulatis, carnosis, sub integris, obtusiusculis, laevibus, sparsis, ramis arcuatis. Floribus corymbosis, petalis esterioribus multo longioribus. Silic. sub ovatis, apice bifidis. Annua.

Thlaspi alpinum foliis Leucoii marini majoris, minoribus rotundis crenatis. Bonan. Tav. 244.

Hab. in Nebrodibus a Munti Scaluni.

ALYSSUM NEBRODENSE

X.

Foliis omnibus spatulatis, floribus luteis, racemosis, racemis compositis. Caulibus diffusis sub lignosis. Tota planta pilis stellatis argenteis obsita.

Perennis.

Hab. in Nebrodibus.

XI.

Caule erecto, lignoso. Foliis cordato-sub rotundis, obsolete lobatis, crenatis. Stipulis cordato-ovatis, acutis. Floribus axillaribus pedunculatis, geminis. Calyce interiori, esteriori fere duplo longiore, laciniis acutis. Petalis obcordatis. Planta viridi-tomentosa.

Perennis.

Hab. prope Agrigentum.

XII.

Caule hirsuto, pilis fasciculato-stellatis, sparsis, foliis inferioribus subrotundo-cordatis, supremis 5-angulato-lobatis, crenato-dentatis, scabris, lobo medio elongato. Pedunculis geminis, petiolo brevioribus. Petalis oblongis, apice bifidis.

Hab. prope Gelam.

XIII.

Caulibus sub erectis, ramosis, dichotomis, glabris, substriatis, ramis patulis. Foliis 2-superior. oppositis, capitulum approssimatis, foliolis obovatis, pilosiusculis, nervosis, dentieulatis. Stipulis membranaceis, nervosis, pilosis. Caudis subulatis sub aequalibus, sub apice pilosis. Capitulis subrotundis. Calycibus nervosis, pilosis, dentibus inaequalibus tubo longioribus, fere setaceis, ciliatis.
Fl. luteis.

Trifol. procumbens villosum? Hall. helv. n. 377.
Hab. in Nebrodibus.

XIV.

Caulibus decumbentibus, minime repentibus, ramosis, glabris, striatis. Foliolis obovatis, obtusis, vel emarginatis, serrulatis, macula alba notatis. Floribus longe-pedunculatis, petioli duplo longioribus. Stipulis nervosis, membranaceis, integris, caudis longissimis, apice subulatis. Floribus capitatis, capitulis subrotundis. Calycibus nervosis, subtus glabriusculis, supra pilosis, post anthesin inflatis, pilosiusculis, reticulatis, quinque-dentatis, dent. acuminatis subaequalibus.

Perennis.

Trifol. capitulis spumosis in summitatibus e purpureo-candidis folio ovato serrato. Bonan. Tav. 69.

Hab. prope Panormum a Bucca di Falcu, *in pratis montuosis*, a la Nivera, *prope Monast. D. Martini*.

XV.

Caulibus 3 - 4 pollic., ramosis, erectis, ramis patulis, pubescentibus. Stipulis basi connatis, caudis sub aequalibus, nervosis, margine viridibus, ciliatis. Foliolis obtusis obovatis, vel emarginatis, denticulatis, rariter ciliatis, nervosis, pedunculis axillaribus petiolo, longioribus. Capit. subrotundis 8 - 12, flor. Floribus pedunculatis, bracteatis, bracteis minimis. Calycibus subpilosis, dent. 2 super. brevissimis. Corol. vexillis cordatis, inflexis: serrulato - ciliatis.

Fl. coeruleo - rubris post anthesin rosco - flavis.

Annum.

Trifolium alpinum humile, rectum. Floribus elegantissimis purpureis in lupuli capitulum concinnatis. Bonan. Tavola 245.

Hab. in Nebrodibus.

XVI.

Caule ramoso, diffuso, anguloso. Foliis obovatis, vel obcordatis, parvis, supra serrulatis. Stipulis, ciliato-dentatis. Leguminibus subsolitariis, cochleatis, utrinque compressis, anfractibus reticulatis 3-4, aculeatis, aculeis, oblongis, setaceis, arcuatis.

Hab. propè Panormum a Bucca di Falcu.

XVII.

Glauca. Foliis radicalibus congestis, spatulatis, in petiolum decurrentibus, acutiusculis, carnosulis, dentatis, ciliatis, margine superiore pilosis, pilis incurvatis. Caule, erecto sub foliato, glabro, squamoso, ramis 4-5, unifloris. Calycibus sub imbricatis, foliolis carina hirsutis. Seminibus uniformibus.

Perennis.

Hab. in Monte Aercta, alla Scalidda di lu S. Uffiziu.

XVIII.

Albicans. Caulibus erectis, pilosis, ramosis, squamosis. Floribus solitariis, inferiori minimo abortivo. Foliis omnibus radicalibus, rigidis, spatulatis in petiolum decurrentibus, dentatis, piloso-scabris, pilis incurvatis. Foliol. calyc. carina pilosis. Seminibus uniformibus.

Fol. non molliuscula, nec caules tenui, et basi tantum scabri.

Perennis.

Hab. in rupib. pr. Martogna.

XIX.

Caule ramoso, squamoso, glabro. Foliis confertis, radicalibus, sub spatulato-oblongis, sinuatis, vel sinuato-dentatis, scabris, sub viridibus, senescentibus apice reflexis, rubris, pilosis, pilis remotiusculis breviusculis, sub incuruis. Foliolis calyc. carina pilosis.

Perennis.

Hab. in Nebrodibus.

XX.

Caule albo-lanato, striato, foliis semiamplexicaulibus, subtus albo-lanatis, supra viridibus, pilosis, scabris, lanceolatis, sinuatis, laciniis dentato-spinosis, spina valida terminatis. Ramis floriferis brevibus. Fl. terminalibus sub corymbosis, sub sessilibus. Calyc. rotundatis lanatis, spina recta terminatis.

Caulis 4 pedalis, et ultra.

Carduus Gigas. foliis sinuato spinosis, ramis floriferis brevibus. Bern. Ucr. l. c.

Carduus Gigas a canthoides, tomentosus. Picnopolisphaerocephalus Cup. Pamph. T. 2 Tav. 338.

Hab. prope Politium, et Collisanum.

INDEX